



JOLOMAX



Új vitamin készítmény valamennyi háziállatnak!

HASZNÁLATA

- csökkenti a naposcsibék elhullását
- elősegíti a fiatal állatok növekedését
- bármilyen megbetegedés esetén kiegészítő terápiaként elősegíti a gyógyulást
- számottevő mértékben növeli az étvágyat, a súlygyarapodást, a takarmány-értékesülést,
- javítja a húsmínőséget, a tojástermelést, a tojás keltethetőségét,
- javítja a termékenyítő képességet, elősegíti a vemhesülést,
- a madaraknak egészséges bőr-és tarajszint biztosít
- 2-3 héttel a várható ellést megelőzően növeli az újszülött állatok életképességét
- kivédi a gyakori stresszhatások (szállítás, átcsoportosítás, takarmányváltás, vakcinázás, szélsőséges időjárás) okozta károkat (étvágytalanság, lábgyengeség, gyomorfekély, másodlagos fertőzések)



Megnövelt vitamintartalommal, nélkülözhetetlen aminosavakkal kiegészítve, könnyen és pontosan adagolható csomagolásban.

KÖNNYŰ ADAGOLÁS

NÉLKÜLÖZHETETLEN AMINOSAVAKKAL KIEGÉSZÍTETT NÖVELT TARTALOM.

ÖSSZETÉTEL:

Vitamin-A (E672)	15 000 000 NE
Vitamin-D ₃ (E671)	1 500 000 NE
Vitamin-E	10 500 NE
Vitamin-K ₃	0,200 g
Vitamin-B ₂	2,000 g
Vitamin-B ₁	1,400 g
Vitamin-B ₆	1,500 g
Vitamin-B ₁₂	0,015 g
D-Pantenol	6,500 g
Nikotinsavamid	15,000 g
Biotin	0,035 g
Kolin-klorid	140,000 g
β-Karotin (E160a)	0,010 g
Metionin	8,000 g
Triptofán	2,000 g
Lizin	10,000 g
Treonin	5,000 g
loncserélt víz	ad 1 000 ml

JOLOMAX

ALKALMAZÁS MÓDJA:

Ivóvízbe keverve. A **JoloMAX** napi adagját annyi ivóvízben kell feloldani, hogy az elkészítést követően azt az állatok 3-4 órán belül elfogyasszák.


Adható még közvetlenül az etetés előtt takarmányba keverve is.


Az alkalmazás javasolt időtartama 3-5 nap.


Mindenképpen ajánlatos a napos állatoknak az első héten, majd a tenyésznövényeknek, tojóállományoknak havonta 1 alkalommal, vemhes állatoknak a vemhesség utolsó harmadában adagolni.


ADAGOLÁS:

Napi adag **100** baromfi részére


 Napos	0-7 napos	5 ml
Növendék csirkék	3-4. hetes	7 ml
Tojó, jérce és tyúk	folyamatosan havonta	11 ml


 Liba	1. hetes	8 ml
	2-3. hetes	11 ml
	3. hét után	7 ml


 Kacsa	1. hetes	7 ml
	2-4. hetes	5 ml
	5. hét után	7 ml

 Pulyka	6 hetes korig	7 ml
	7-8 hetes korig	10 ml
	9-20 hetes korig	15 ml

 Galamb	életkortól függően	2-5 ml
--	------------------------------	--------

 **Sertés:** Kocásüldőknek és vemhes kocáknak 10 napos kúraszerű adagolás ajánlott, naponta 6 ml. Malacoknak naponta egyedenként 1 ml, 5 napon keresztül. Két hetes szünet után újra adható.

 **Szarvasmarha:** Itatós borjú – naponta, egyedenként – 4 ml, 5 napon keresztül. Üszőknek és teheneknek – vemhesség előtt, 10 napos kúraszerű adagolás javasolt naponta, egyedenként 10 ml.

 **Nyúl:** 100 db nyúl részére – választásig – naponta 4 ml, 5 napon keresztül. 100 db anyanyúl részére naponta 10 ml, 5 napon át.

FORGALMAZZA: TolnAgro Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi út. 146.

ELÉRHETŐSÉG:

Tel.: +36 74/528-528 Fax: +36 74/528-530

Mobil: +36 30/33-11-111, +36 20/22-21-133,
+36 70/77-11-333

megrendeles@tolnagro.hu